

Procedura informacji dla pacjenta na temat antybiotyków.

Załącznik: Informacja dla pacjenta na temat antybiotyku i leku przeciwbólowego, stosowanych po wszczepieniu implantów.

Dalacin - antybiotyk szczególnie skuteczny w przypadku zapaleń kości. Może powodować bóle brzucha i biegunki. W razie ich wystąpienia prosimy o kontakt z lekarzem.

Jeśli przepisany przed zabiegiem: wziąć na trzy godziny przed zabiegiem dwie tabletki.

Po zabiegu wziąć jak najszybciej 2 tabletki. Następnie przyjmować w następujący sposób: rano po wstaniu, w południe przed obiadem, wieczorem przed snem. W ciągu dnia, około 2 godziny po przyjęciu antybiotyku jeść niewielkie ilości kefirów i jogurtów oraz łykać trilac.

U kobiet częstym powikłaniem tego antybiotyku są zaburzenia ginekologiczne (grzybice). W związku z tym zapobiegawczo kobiety powinny stosować również globulki Lactovaginal co drugi dzień na zmianę z Nystatini 100 000 j. tab. Vag. (np. w dni parzyste Lactovaginal w dni nieparzyste Nystatini).

Ketonal - lek przeciwbólowy

Ketonal forte 100 to silny lek przeciwbólowy. Jedna tabletka tego leku wystarcza na co najmniej kilka godzin. Nie łykać naraz więcej niż jednej tabletki. Lek zaczyna silnie działać dopiero po upływie około 30 minut. U zdrowych pacjentów szkodliwość leku jest niewielka, może być on jednak niebezpieczny u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. W celu zmniejszenia szkodliwego działania leku na żołądek i dwunastnicę polecamy przyjmowanie go razem z lekiem osłonowym Omeprazol